

Criterios diagnósticos de la Enfermedad de ALZHEIMER

Nombre: _____ Varón [] Mujer []
 Fecha: _____ F. nacimiento: _____ Edad: _____
 Estudios/Profesión: _____ N. Hª: _____
 Observaciones: _____

Criterios "NINCDS-ADRDA" (McKhan et al., 1984)	Criterios DSM-IV
<p>ENFERMEDAD DEFINITIVA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se reúnen los criterios de enfermedad probable 2. Evidencias obtenidas por biopsia o autopsia <p>ENFERMEDAD PROBABLE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La demencia queda establecida por cuestionarios (MMSE, Blessed,...) y pruebas neuropsicológicas 2. Déficits en 2 o más áreas cognitivas 3. Deterioro progresivo de la memoria y de otras funciones cognitivas 4. No existen trastornos de la conciencia (delirios) 5. El inicio de la enfermedad se encuentra entre los 40 y los 90 años, a menudo después de los 65 años. 6. Otra enfermedad no explica el deterioro del paciente <p>El diagnóstico se ve apoyado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Alteración de los patrones de conducta e incapacidad para realizar tareas cotidianas. . Deterioro de funciones cognitivas específicas (afasia, apraxia, agnosia). . Historia familiar, sobretodo con confirmación neuropatológica . Resultados de laboratorio: punción lumbar normal, EEG normal o inespecífico, TC mostrando atrofia o TC normal para la edad . <i>Síntomas asociados:</i> depresión, insomnio, incontinencia, alucinaciones, delirios, ilusiones, explosiones verbales, físicas, emocionales <p>ENFERMEDAD POSIBLE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Síndrome de demencia en ausencia de otras enfermedades 2. O en presencia de otra enfermedad la cual no es considerada la causa de la misma. <p>ENFERMEDAD DE ALZHEIMER IMPROBABLE si</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inicio brusco 2. Signos neurológicos focales 3. Crisis epilépticas o trastornos de la marcha que surgen tempranamente en el curso de la enfermedad 	<p>A. Múltiples déficits cognitivos que se manifiestan por:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) deterioro de la memoria (2) uno (o más) de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> . afasia (alteración del lenguaje). . apraxia (deterioro de la capacidad para llevar a cabo actividades motoras). . agnosia (fallo en el reconocimiento o identificación de objetos). . alteración de la ejecución (planificación, organización, secuenciación y abstracción). <p>B. Los anteriores déficits cognitivos provocan un deterioro significativo de la actividad laboral o social.</p> <p>C. El curso se caracteriza por un inicio gradual y un deterioro cognitivo continuo.</p> <p>D. Los déficits cognitivos no se deben a ninguno de los siguientes factores:</p> <ul style="list-style-type: none"> . otras enfermedades del sistema nervioso central que provocan déficits de memoria y cognitivos (Parkinson, Corea,...). . enfermedades sistémicas (hipotiroidismo, neurosífilis,...). . enfermedades inducidas por sustancias. <p>E. Los déficits no aparecen exclusivamente en el transcurso de un delirium.</p> <p>F. La alteración no se explica mejor por la presencia de un trastorno depresivo mayor, esquizofrenia,...</p>